

Divisions du limbe, presque toujours entières, rarement munies de quelques pinnules très-fines, cotonneuses à l'intérieur, glanduleuses extérieurement, plus longues que la corolle. Étamines très-nombreuses. Stygmates réunis en une tête sessile au centre de la fleur. Fruit ellipsoïde.

*Énumération des variétés de ce Rosier.*

R. REDUTEA.

R. *germinibus ovato-globosis, glabris hispidois; pedunculis glanduloso-hirsutis; foliis ellipticis, utrinque glabris, simpliciter serratis; petiolis subaculeatis; aculeis caulinis inaequalibus subrectis, numerosissimis; floribus geminatis ternatis; laciniis calycinis corollam inapertam superantibus; fructibus subglobosis.* THY. R. REDUTEA, etc., p. 3. Annales Enc. de MELLIN, janv. 1818, p. 35.

2. R. *Redutea glauca, foliis glaucis acutis subdiscoloribus; floribus albis, apice rubello punctatis.* THY. l. c.

R. (*Spinosissima*) *nova variegata.* Du P. Choix des Roses, p. 3.

Rosier très-épineux à fleurs vergetées de rose, et à feuilles glauques. Le même, cat. inédit, série 4<sup>e</sup>, n° 11. Vulg. *la Pimprenelle à feuilles glauques. La Redouté à feuilles glauques.* Cette variété a le port du R. *Rubrifolia*.

3. R. *Redutea parvifolia, aculeis caulinis subrectis inaequalibus (majores foliolorum longitudine); foliis subrotundis, floribus albidis.* THY. l. c. p. 5, var. 3. Annales Enc. l. c. p. 37, var. B. *La Redouté à petites feuilles.*

Rameaux allongés, flexibles, couverts d'aiguillons jaunâtres, serrés et d'inégale longueur. Folioles petites et presque rondes. Pétioles, pédoncules et tubes des calices glabres. Fleurs blanchâtres geminées ou ternées.

Cette variété a quelque rapport avec le *Myriacantha* de M. DE CANDOLLE; mais celui-ci en diffère par ses pédoncules uniflores, ses folioles doublement dentées, et par ses aiguillons beaucoup plus longs.

4. R. *Redutea Rubescens, germinibus globosis, pedunculis laciniisque hirsutis; foliis lucidis glabris subdiscoloribus; petiolis subaculeatis; caule aculeis numerosissimis, sparsis, inaequalibus, subrectis, purpureis; floribus rubris.* THY. l. c., p. 5, var. 4. Ann. Enc. l. c. var. C.

R. (*Parviflora*). Du P. cat. inédit, série 16. Nouv. DUHAM. t. 7, p. 18, excl. var. a.

R. (*Blanda*). ANDR. R. fig. Vulg. *la Redouté à tiges et à épines rouges.*

Ces trois arbustes avaient été jusqu'aujourd'hui confondus avec le Rosier à feuilles de Pimprenelle; mais ils en diffèrent :

1<sup>o</sup> Par leurs aiguillons qui persistent sur les tiges adultes : le Rosier Pimprenelle les perd en vieillissant;

2<sup>o</sup> Par leurs pédoncules multiflores : les pédoncules sont toujours uniflores dans le Rosier à feuilles de Pimprenelle;

3<sup>o</sup> Par leurs divisions calicinales plus longues que la corolle avant son épanouissement : ces mêmes divisions sont toujours plus courtes dans le Rosier Pimprenelle.

On doit considérer le *Rosa Redutea* comme un hybride du R. *Pimpinellifolia* et du R. *Rubrifolia*, d'où comme ces deux plantes de la faculté de se féconder et devenu, ainsi, le type d'un Rosier nouveau qui a été dédié au peintre de cet ouvrage.